

Rózsailonca - *Archips rosana* L.

A lepke testhossza 8-10 mm, szárny-fesztávolság: 18-23 mm. A hím elülső szárnyainak alapszíne a vörösbarnától a szürkésbarnáig változhat, éles kontúrú rajzolattal. Ivesen kihegyesedő szárnycsúcsán sötétbarna folt látható. Hátsó szárnyai szürkésbarnák. A nőstény elülső szárnya élesebb csúcsban végződik, rajzolata elmosódóbb.

A hernyó tápnövénye: alma, birs, kajszi, szilva, cseresznye, meggy, málna, köszméte, ribiszke, szeder.

Kárképe: a kis hernyó a rügyekben károsít, azok torzán fakadnak, a levelek összesodrottak. Virágzaskor a hernyó a termőrészekkel táplálkozik, a szirmokat összeszövi, így azok nem bomlanak ki, hanem megbarnulnak. Később a leveleket tölcsérszerű szivarrá szövi össze.



A lepke, amit a csapda fog



A CSALOMON® feromoncsapdát a gyümölcsösben 1-1,5 m magasságban, a lombkoronába, lehetőleg lombos ágra akasszuk; málnásban, ribizskésben a bokrok felső részébe, a növény hajtására. A csapdázás megkezdésének szokásos időpontja május közepe.



A CSALOMON® csapda szelektivitása: jelentős számban foghat más sodrómoly fajt, pl. *Clepsis strigana*-t, melynek alakja keskenyebb és színezete jóval világosabb a rózsailoncaénál; ill. tölgyerdő közelében *Tortrix viridana*-t, mely zöld színű. Az esetleg berepülő *Yponomeuta* fajok alakja jóval keskenyebb, szárnymintázatuk fehér alapon sötét pontokból áll. Csekély számban foghat még csüngőlepke (*Zygaena*) fajt is, mely jóval nagyobb és szárnya fekete alapon fehér vagy piros foltos.

A CSALOMON® csapda vonzóképesége: környezettől függően 4-6 hét. Ezután a csapdát a biztonságos rajzaskövetés érdekében cserélje újra! Ragacslapcsere: a fogástól függően (általában 7-10 naponként).

A lárva, melynek kártételét meg kell előznünk


Feromoncsapdáinkkal kiválóan követhetjük a lepkék megjelenését és rajzásmenetét. A fogások alapján időzített védekezés akkor a leghatékonyabb, ha a frissen kikelő kis hernyók ellen irányul. Az első permetezést a rajzáskezdet után 8-10 nappal, - ill. egy másodikat 10-12 nappal ezt követően - érdemes elvégezni.

Ajánlott szerek alkalmazhatók[1,2]. (A rovarölőszerek használatánál szigorúan tartsa be a vonatkozó munka- és egészségvédelmi előírásokat!)

Vegye tekintetbe az alternatív védekezési módszereket is! [3]

[1] *Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok. Évente megjelenő kiadvány, beszerezhető: megyei Növényvédő (NTSZ) Állomások; www.ontsz.hu/engedelyezes/nyitolap.html; WIN-PESZTI (www.relemi.hu).*

[2] Szabó és mtsi (eds): *Integrált termesztés a kertészetben, 15, BFNTÁ, 1994.* [3] *Biogazda 2., Biokultúra Egyesület, 1994*



A **Csalomon N** az MTA ATK Növényvédelmi Intézet bejegyzett védjegye.

Megrendelés / felvilágosítás: MTA ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest, Pf. 102., 1525; tel.: (1)-391-8637, 06-30-9824999; fax: (1)-3918655; e-mail: <csalomon@julia-nki.hu> vagy <h2371tot@ella.hu>; internet:

<www.julia-nki.hu/csalomon>



Fotó: Nagy Z. L.

Így néz ki, ha a CSALOMON® RAG csapda megfogta!