

## Nyerges szőlőmoly – *Eupoecilia* (v.*Clysia*) *ambiguella* Hbn.

A lepke testhossza 6-7 mm, szárny-fesztávolsága 13-15 mm. Az elülső szárnya fakósárgától a szalmasárgáig változik, rajta jellegzetes, lefelé szélesedő, trapéz alakú fekete, vagy barna harántsáv, "nyereg" húzódik.

A hernyó tápnövénye: szőlő, ribiszke. Kárképe: az első hernyónemzedék a talajközeli virágkezdeményeket, a második nemzedék a szőlőszemeket károsítja, a fűrészrészeken sűrű, csőszerű szövedéket képez. A feromoncsapdát a tőke művelési módjától függően 1 - 1,5 m magasságban (a szőlőfürtök magasságában) helyezük el, lehetőleg lombos vesszőre akasztva. A csapdázás megkezdésének javasolt időpontja április közepe.

A CSALOMON® csapda szelektivitása: er-dőszéli bokros közelében esetenként fog-hat nagyobb mennyiségben *Cnephasia* fa-jokat, elsősorban *C. eculliana*-t, amely a nyerges szőlőmólnál valamivel kisebb és elülső szárnya egyszínű feketésszürke.



**A lepke, amit a csapda fog**



ziva.avcr.cz

**A lárva és kártétele, amit meg kell előznünk**



www.pinus-tki.si

A CSALOMON® csapda vonzóképesége: környezeti viszonyoktól függően 4-6 hét. Ezután a csapdát a biztonságos rajzáskövetés érdekében cserélje újra! Ragacslapcsere: a fogástól függ (általában 7-10 naponként).

A faj megjelenésének jelzéséhez. ill. rajzá-sának követéséhez világszerte elterjedt és szinte kizárólagos módszer a feromonos csapdázás.

A csapdafogások alapján időzített permetezésre legalkalmasabb sort keríteni a tömeges rajzás (a fogás néhány napon belül többszörösére nő!) megkezdődése után 7-8 nappal! Hazai tapasztalatok szerint általában nem szükséges védekezni, ha a hetenkénti fogás nem haladja meg a 25-30-at csapdánként [1]. A védekezés-re ajánlott szerek alkalmazhatók [2,3].




attra.ncat.org

(A rovarölőszerek használatánál szigorúan tartsa be a vonatkozó munka- és egészségvédelmi előírásokat!) Vegye tekintetbe az alternatív védekezési módszereket is! [4]

[1] Diófási és Sélley: *Agrofórum* 6:29, 1995. [2] Vörös és Tiszáné: *Agrofórum* 6:26, 1995. [3] Szabó és mtsi (eds): *Integrált természet a kertészetben*, 15, BFNTÁ, 1994. [4] *Biogazda* 2., Biokultúra Egyesület, 1994.



**A lárva kártétele, amit meg kell előznünk**



A **Csalomon** az MTA ATK Növényvédelmi Intézet bejegyzett védjegye.

Megrendelés / felvilágosítás: MTA ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest, Pf. 102., 1525; tel.: (1)-391-8637, 06-30-9824999; fax: (1)-3918655; e-mail: <csalomon@julia-nki.hu> vagy <h2371tot@ella.hu>; internet: <www.julia-nki.hu/csalomon>





Így néz ki ha a CSALOMON<sup>®</sup> RAG csapda megfogja!