

Közepes fésűsbagoly - *Orthosia stabilis* Den. et Schiff..

A lepke szárnyainak fesztávolsága 31-33 mm. Az elülső szárnyak alapszíne barnás, sárgás. A határolt vesefolt és körfolt, valamint a szegélyek menti cikk-cakkos vonal jól látható.



A lepke, amit a csapda fog

A hernyó tápnövénye: számos erdei lombhullató fa, mint pl. tölgy, bükk, hárs, nyár. Esetenként gyümölcsfákon, pl. szilván (Spanyolo.), cseresznyén és almán (Franciao.) is károsíthat. Kárképe: a közepes fésűsbagoly hernyójának évente egy kártételi időszaka van, május - júniusban. A fiatal hernyók a leveleken hámozgatnak, a nagyobbak viszont lerágják a leveleket, később a fejlődő kis gyümölcsöket is károsíthatják. A hernyók ragadoznak is; kisebb hernyókat, más lárvákat is fogyasztanak.


A feromoncsapdát a fák koronájának alsó részére, a gyümölcsfák, vagy bokrok ágaira, 1 - 1,5 m magasságban, lehetőleg szélvédett helyre helyezük ki, nehogy az erős szél a csapdát "megpörgethesse". A csapdázás megkezdésének javasolt időpontja március eleje.

A CSALOMON® csapda szelektivitása: alkalmanként foghat néhányat a *Polyphoca ridens* bagolylepkéből, amelyet könnyen megkülönböztethetünk a közepes fésűsbagolytól eltérő szárnymintázata és színezete alapján.

A CSALOMON® csapda vonzóképesége: környezeti viszonyoktól függően 6-8 hét. Ez általában elegendő a közepes fésűsbagoly teljes rajzásának követésére. RAG csapdatípus: érzékeny detektáláshoz, ha a legfontosabb cél a megjelenés minél érzékenyebb jelzése. Ragacslapcsere: a fogástól függ, szükség szerint (ált. 7-10 naponként, ill. tömeges rajzás esetén sűrűbben, mivel az aránylag nagy lepke fogásai hamar telíthetik a csapdát!) VARL+ csapdatípus: a populáció mennyiségi változásait (rajzás menetét) jobban követi, tömeges fogásra is alkalmas! A megfelelő fogáshoz feltétlenül szükséges a csapda fogóedényébe került lepkéket előlni.

Feromoncsapdáinkkal kiválóan követhetjük a lepkék megjelenését és rajzásmenetét. Általában nem okoz akkora kárt, hogy külön védekezni kelljen ellene. Tömeges felszaporodás esetén más lombrágó hernyókhhoz hasonlóan a védekezésre ajánlott szerek alkalmazhatók [1] (A rovarölőszerek használatánál szigorúan tartsa be a vonatkozó munka- és egészségvédelmi előírásokat!)

[1] Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok. Évente megjelenő kiadvány, beszerezhető: megyei Növényvédő (NTSZ) Állomások; www.ontsz.hu/engedelyezes/nyitolap.html; WIN-PESZTI (www.relemi.hu)



A **Csalomon N** az MTA ATK Növényvédelmi Intézet bejegyzett védjegye.

Megrendelés / felvilágosítás: MTA ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest, Pf. 102., 1525; tel.: (1)-391-8637, 06-30-9824999; fax: (1)-3918655; e-mail: <csalomon@julia-nki.hu> vagy <h2371tot@ella.hu>; internet: <www.julia-nki.hu/csalomon>

Így néz ki, ha a
CSALOMON® RAG csapda
megfogta

10 mm

közepes fésűsbagoly
O. stabilis