

## Nagy rügysodrómoly - *Recurvaria leucatella* Clerk.

A lepke összezárt szárnyakkal ülve 13-15 mm hosszú. Barnásszürke alapszínű elülső szárnyának töve felőli harmadában feltűnő, széles, fehérszínű harántsáv húzódik végig. Hátsó szárnyai barnásszürkék.



ukmoths.org.uk

**A lepke, amit a csapda fog**

A hernyó tápnövénye: alma, valamennyi almatermésű és csonthéjas gyümölcsfa. Kárképe: ősszel hámozgatás a levélfonákon (a kis hernyó kártétele), tavasszal rügypusztítás és levélsodrás (áttelelt kifejlett hernyó).

A feromoncsapdát 1,5 - 2 m magasságban a koronába, lombos ágra akasszuk. A csapdázás megkezdésének szokásos időpontja május közepe.


A CSALOMON® csapda szelektivitása: más lepke csak véletlenszerűen repül bele.

A CSALOMON® csapda vonzóképesége: környezeti viszonyoktól függően 4-6 hét. Ezután a csapdát a biztonságos rajzáskövetés érdekében cserélje újra! Ragacslapcsere: a fogástól függ, szükség szerint (általában 7-10 naponként).

Feromoncsapdáinkkal kiválóan követhetjük a lepkék megjelenését és rajzásmenetét. A kártevő rajzása általában elhúzódó, számára kedvező év esetén több rajzáscsúcs is kialakulhat.

A védekezésre ajánlott szerek alkalmazhatók a virágzás után a kifejlett hernyók ellen [2]. A peték és a kikelő kis hernyók ellen később használható szerek is vannak[1]. (A rovarölőszerek használatánál szigorúan tartsa be a vonatkozó munka- és egészségvédelmi előírásokat!) Vegye tekintetbe az alternatív védekezési módszereket is! [3] A nagy rügysodrómoly hím lepkék fogására alkalmas feromoncsapda kifejlesztését világelsőként a magyar kutatók végezték el! [4]

[1] Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok. Évente megjelenő kiadvány, beszerezhető: megyei Növényvédő (NTSZ) Állomások; [www.ontsz.hu/engedelyezes/nyitolap.html](http://www.ontsz.hu/engedelyezes/nyitolap.html); WIN-PESZTI ([www.relemi.hu](http://www.relemi.hu)) [2] Szabó és mtsi (eds): Integrált termesztés a kertészetben, 15, BFNTÁ, 1994. [3] Biogazda 2., Biokultúra Egyesület, 1994. [4] Tóth M. & Doolittle, R. Növényvédelem 29: 110-116, 1993.



A **Csalomon N** az MTA ATK Növényvédelmi Intézet bejegyzett védjegye.

Megrendelés / felvilágosítás: MTA ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest, Pf. 102., 1525; tel.: (1)-391-8637, 06-30-9824999; fax: (1)-3918655; e-mail: <[csalomon@julia-nki.hu](mailto:csalomon@julia-nki.hu)> vagy <[h2371tot@ella.hu](mailto:h2371tot@ella.hu)>; internet: <[www.julia-nki.hu/csalomon](http://www.julia-nki.hu/csalomon)>



nagy rügysodróm.  
R. leucatella

Fotó: Nagy Z. L.

Így néz ki, ha a CSALOMON® RAG csapda megfogta!