

Almalevél-tarkamoly - *Swammerdamia pyrella* Villiers

A lepke kiterjesztett szárnyainak fesztávolsága 10-12 mm. Elülső szárnyai szürkék, a szárnycsúcs körüli rojt rézszínűben csillog. Hátsó szárnya világosszürke. A molylepke feje jellegzetesen fehér, vagy sárgásfehér, teste szürkés.

A hernyó tápnövénye: alma, körte, meggy, szilva, esetleg kajszli.

Kárképe: a fiatal hernyó az epidermisz rétegek között rág szabálytalan, áttetsző aknát, amely 9 mm² nagyságú is lehet. Később a levél fonákán hámozgat, de meghagyja a főbb ereket és a felső epidermiszt. Ha két levél lappal egymáshoz ér, akkor közöttük az alsó levélnek a felszíni, a felső levélnek a fonáki epidermisztét fogyasztja el. E hámozó rágás mozaikszerű hiánynak tűnik.

A feromoncsapdát a fák koronájába, lombos ágra, 1,5 - 2 m magasságban helyezzük ki. A csapdázás megkezdésének szokásos időpontja március vége.


A CSALOMON® csapda szelektivitása: a csapda egyes években jelentős mennyiségű bagolylepkét foghat (pl. *Atethmia ambusta*, *Actinotia polyodon*), melyek jóval nagyobbak és a célkártevőtől könnyen megkülönböztethetők.

A CSALOMON® csapda vonzóképesége: környezeti viszonyoktól függően 4-6 hét. Ezután a csapdát a biztonságos rajzáskövetés érdekében cserélje újra! Ragacslapcsere: a fogástól függően, szükség szerint (általában 7-10 naponként).

Az almalevél-tarkamoly kártevőként van számon tartva Európában, É-Afrikában és Japánban. Hazánkban, bár mindenütt jelen van, csak potenciális kártevőnek számít. Feromoncsapdáinkkal észlelhetjük a kártevő jelenlétét, tömeges fogás esetén felkészülhetünk a szükséges védekezésre.



A lepke,
amit a csapda fog



A tavaszi hernyóaszpektus ellen virágzás előtt alkalmazott permetezés e faj hernyóit is sikeresen gyéríti [1]. (A rovarölőszerek használatánál szigorúan tartsuk be a vonatkozó munka- és egészségvédelmi előírásokat!)
[1] *Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok. Évente megjelenő kiadvány, beszerezhető: megyei Növényvédő (NTSZ) Állomások; www.ontsz.hu/engedelyezes/nyitolap.html; WIN-PESZTI (www.relemi.hu)*



Így néz ki, ha a
CSALOMON® RAG
csapda megfogta!



A **Csalomon N** az MTA ATK Növényvédelmi Intézet bejegyzett védjegye.

Megrendelés / felvilágosítás: MTA ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest, Pf. 102., 1525; tel.: (1)-391-8637, 06-30-9824999; fax: (1)-3918655; e-mail: <csalomon@julia-nki.hu> vagy <h2371tot@ella.hu>; internet:

<www.julia-nki.hu/csalomon>

© MTA NKI 2010