

## Tavaszi sodrómoly - *Tortricodes tortricella* Hbn.

A lepke szárny-fesztávolsága 9-11 mm. Elülső szárnya sárgásbarna fehéres és sárgás bemosódásokkal. Rajzolata bizonytalan kontúrú feketésbarna keresztsávból és foltból áll. Hátsó szárnyai világos barnásszürkék.

A hernyó tápnövénye: tölgy, kökény, gyertyán, hárs, nyír. Kárképe: a leveleket fogyasztja.

A feromoncsapdát 1,5 - 2 m magasságban, a fa vagy bokor ágára akasszuk. A csapdázás megkezdésének javasolt időpontja február vége.

A CSALOMON® csapda szelektivitása: tölgyerdőben a célfaj rajzásidejében más fajt nem fog.

A CSALOMON® csapda vonzóképesége: környezeti viszonyoktól függően 4-6 hét. Ezután a csapdát a biztonságos rajzaskövetés érdekében cserélje újra!


Ragacslapcsere: a fogástól függően, szükség szerint (általában 7-10 naponként).

Feromoncsapdáinkkal kiválóan követhetjük a lepkék megjelenését és rajzásmenetét. A kártevő elleni védekezésre csak alkalmanként van szükség. Ebben az esetben más sodrómolyok-hoz hasonlóan sikerrel alkalmazhatjuk védekezésre a szokásos szereket [1]. (A rovarölőszerek használatánál szigorúan tartsa be a vonatkozó munka- és egészségvédelmi előírásokat!) Vegye tekintetbe az alternatív védekezési módszereket is! [2].

[1] Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok. Évente megjelenő kiadvány, beszerezhető: megyei Növényvédő (NTSZ) Állomások; [www.ontsz.hu/engedelyezes/nyitolap.html](http://www.ontsz.hu/engedelyezes/nyitolap.html); WIN-PESZTI ([www.relemi.hu](http://www.relemi.hu)) [2] Biogazda 2., Biokultúra Egyesület, 1997.

A lepke, amit a csapda

fog





Igy néz ki, ha a  
CSALOMON® RAG  
csapda megfogta!

tavaszi sodróm.  
*T. tortricella*



A **Csalomon** az MTA ATK Növényvédelmi Intézet bejegyzett védjegye.

Megrendelés / felvilágosítás: MTA ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest, Pf. 102., 1525; tel.: (1)-391-8637, 06-30-9824999; fax: (1)-3918655; e-mail: <csalomon@julia-nki.hu> vagy <h2371tot@ella.hu>; internet: <www.julia-nki.hu/csalomon>