

Fésűs földibagoly - *Agrotis crassa* Hbn.

A lepke szárnyainak fesztávolsága 40-45 mm. Hasonló kinézetű, de nagyobb és testesebb, mint a vetési bagolylepke (*A. segetum*). A hímek csápjai fésűsek. Az elülső szárnyai alapszíne szürkésbarna, a foltok és vonalak sokkal sötétebbek, jól kirajzolódnak. A csapfolt rövid és nagyon széles.

A hernyó tápnövénye: szántóföldi és zöldségnövények, burgonya, spárga, gabonafélék, esetenként szőlő is.

Kárképe: a hernyók a talajban élnek, és a gumókat és gyökereket támadják meg. Általában hazánkban másodlagos jelentőségű.

A feromoncsapdát a vizsgált növénykultúra közelébe, a lombozat tetejének szintjére helyezük ki. A csapdákat a közeli gyümölcsfák, vagy bokrok lombos ágaira is előnyös kiakasztani 1,0-1,5 m magasságban, lehetőleg szélvédett helyre, nehogy az erős szél a csapdát "megpörgethesse". A csapdázás megkezdésének javasolt időpontja május közepe.

A CSALOMON® csapda szelektivitása: a csapdába az fésűs földibaglyon kívül esetenként néhány példány a gamma bagolylepkéből (*Autographa gamma*) vagy a vetési bagolylepkéből is berepülhet. A gamma bagolynál a szárnyak sokkal sötétebb alapszínűek, és a jellegzetes "Y" jel jól látható. A vetési bagolylepkék kisebbek, keskenyebbek, és a csapfoltjuk kisebb, jelentéktelenebb. (Felhívjuk a figyelmet, hogy csapdavasztékunkban a gamma ill. vetési bagolylepkékre célzottan optimalizált, fajspecifikus csapdák is kaphatók!). Más lepkék csak véletlenszerűen repülnek a csapdába, s jól megkülönböztethetőek a fésűs földibagolytól kisebb termetük, ill. eltérő szárnymintázatuk alapján.




A lepke, amit a csapda fog



A CSALOMON® csapda vonzóképesége: környezeti viszonyoktól függően 4-6 hét. Ezután a csapdát a biztonságos rajzáskövetés érdekében cserélje újra!

A RAG ragacsos csapdatípus kiválóan alkalmas a faj jelenlétének észlelésére, és a rajzás követésére. A ragacsos cseréje 7 - 10 naponként (ill. rajzáscsúcs idejében még gyakrabban) szükséges lehet.



az MTA ATK Növényvédelmi Intézet bejegyzett védjegye.

Megrendelés / felvilágosítás: MTA ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest, Pf. 102., 1525; tel.: (1)-391-8637, 06-30-9824999; fax: (1)-3918655; e-mail: <csalomon@julia-nki.hu> vagy <h2371tot@ella.hu>; internet: <www.julia-nki.hu/csalomon>



Fotó: Nagy Z. L.

Így néz ki, ha a CSALOMON® RAG csapda megfogta!