

Sápadt sodrómoly - *Aphelia paleana* Hbn.

A lepke kiterjesztett szárnyainak fesztávolsága 18-23 mm. Elülső szárnyai okkersárgától csontsárgáig, egyszínűek. Hátsó szárnya világosabb sárga.

A hernyó tápnövénye: a faj kárt okozhat a pázsitfűféléken (*Phleum*), kukoricán, de a faj eredeti tápnövényei közé számos más kétszikű (*Anemone*, *Carduus*, *Centaurea*, *Lonicera*, *Plantago*, *Ranunculus*, stb.) tartozik. Hazánkban általában másodlagos jelentőségű kártevő.

A feromoncsapdát a növényzet felső szintjének magasságába, 1,0- 1,5 m magasan helyezzük ki. A csapdázás megkezdésének szokásos időpontja **április vége**.

A CSALOMON® csapda szelektivitása: a csapdák egyes években jelentősebb mennyiségű ékes sodrómolyt (*Argyrotaenia pulchellana*) is foghatnak, mely jelentősen kisebb a sápadt sodrómolytól és szárnyain tarka mintázat van, a célkártevőtől könnyen megkülönböztethetők.

A CSALOMON® csapda vonzóképesége: környezeti viszonyoktól függően 4-6 hét. Ezután a csapdát a biztonságos rajzáskövetés érdekében cserélje újra! Ragacslapcsere: a fogástól függően, szükség szerint, (általában 7-10 naponként).

A sápadt sodrómoly egész Európában (az Ibériai félsziget kivételével) és Szibériában fordul elő. Alkalmankénti kártevőként van számontartva Angliában, Svédországban, Norvégiában és Finnországban. Magyarországon, bár mindenütt jelen van, csak potenciális kártevőnek számít.

ukmoths.org.uk



upload.wikimedia.org




A lepke, amit a csapda fog

Feromoncsapdáinkkal észlelhetjük a kártevő jelenlétét, tömeges fogás esetén felkészülhetünk a szükséges védekezésre. A tavaszi hernyóaszpektus ellen virágzás előtt alkalmazott permetezés e faj hernyóit is sikeresen gyéríti [1].

(A rovarölőszerek használatánál szigorúan tartsuk be a vonatkozó munka- és egészségvédelmi előírásokat!)

[1] Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok. Évente megjelenő kiadvány, beszerezhető: megyei Növényvédő (NTSZ) Állomások; www.ontsz.hu/engedelyezes/nyitolap.html; WIN-PESZTI (www.relemi.hu)



A **Csalomon N** az MTA ATK Növényvédelmi Intézet bejegyzett védjegye.

Megrendelés / felvilágosítás: MTA ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest, Pf. 102., 1525; tel.: (1)-391-8637, 06-30-9824999; fax: (1)-3918655; e-mail: <csalomon@julia-nki.hu> vagy <h2371tot@ella.hu>; internet: <www.julia-nki.hu/csalomon>



Fotó: Nagy Z. L.

sápadt sodrócm.
A. paleana

Így néz ki, ha a CSALOMON® RAG csapda megfogta!