


# Télimoly - *Diurnea phryganella* Hbn.

A szárnyak fesztávolsága 17-25 mm. Az elülső szárnyak okkerbarnák, alig látható, gyenge rajzolattal. Egy-egy sötét pont van a sejt egyharmadában és a végén, közöttük a sejt alján 1 hosszanti fehér vonás. A hátsó szárnyak szürkék. A nőstények (melyeket a feromoncsapda NEM fog) röpképtelenek, szárnyaik rövidebbek, mint a híméi, jóval keskenyebbek és hegyesebbek.

A hernyó tápnövénye: tölgy és rokon lombosfák.

Kárképe: a hernyók a levézet összerágásával okozhatnak kárt. Általában két összeszövött levél között élnek.



commons.  
wikimedia.org



insektenfotos.de



odezia-atrata.be

*A lepke, amit a csapda fog*



rodeland.de

*A lepke, amit a csapda fog*

A feromoncsapdát 1,0 - 1,5 m magasságban helyezük ki, a fák és bokrok ágaira, vagy a fatörzsek mellé.

A csapdázás megkezdésének szokásos ideje október eleje.



commons.wikimedia.org

A CSALOMON® csapda szelektivitása: tölgyes erdőben a télimoly rajzási idejében ritkán fog más lepkét a csapda. Más biotópokban és korábban a szezon folyamán foghat néhány százalékban más sodrómolyokat (pl. *Archips* fajokat, vagy sápadt sodrómolyt - *Aphelia paleana*-t, stb.), a télimoly ezektől könnyűszerrel megkülönböztethető szárnya alakja és színezete alapján.

A CSALOMON® csapda vonzóképesége: környezeti viszonyoktól függően 4-6 hét. Ez általában elegendő az azévi teljes télimoly rajzás követéséhez. Ezután a csapdát a biztonságos rajzáskövetés céljából cserélje újra! Ragacsclapcsere: a fogástól függ, szükség szerint (általában 7-10 naponként).

A télimoly potenciális erdészeti károsító.[1] Feromoncsapdáinkkal minden más módszernél érzékenyebben észlelhetjük a kártevő megjelenését és követhetjük rajzásmenetét. A télimoly feromonos csapdázásáról magyar tudósok publikáltak.[2]

[1] Gozmány: *Microlepidoptera IV. In: Székessy, V. (ed.): Magyarország Állatvilága. Lepidoptera XVI/A, pp. 295, [2] Tóth, Acta Phytopath. Acad. Sci. Hung. 14:195 (1979).*



A **Csalomon** az MTA ATK Növényvédelmi Intézet bejegyzett védjegye.

Megrendelés / felvilágosítás: MTA ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest, Pf. 102., 1525; tel.: (1)-391-8637, 06-30-9824999; fax: (1)-3918655; e-mail: <csalomon@julia-nki.hu> vagy <h2371tot@ella.hu>; internet: <www.julia-nki.hu/csalomon>

Fotó: Koczor S.



Így néz ki, ha a CSALOMON® RAG csapda megfogta!