

Fenyőilonca - *Evetria buoliana* Den & Schiff.

A lepke teste 8 mm hosszú, a szárnyak fesztávolsága 18-23 mm. Elülső szárnyainak alapszíne téglavörös, melyen harántirányú ezüstös vonalak futnak. Hátsó szárnyai barnásszürkék.



ukmoths.org.uk

A lepke, amit a csapda fog



www.forestpests.org

A hernyó tápnövénye: erdei- és feketefenyő, más *Pinus* fajok.

Kárképe: a fiatal fák hajtáscsúcsa elpusztul, később az egyik oldalhajtás "helyettesíti". Maradandó, "S" alakú csúcsfajtás görbülés látható.

A CSALOMON® feromoncsapdát 2 - 2,5 m magasságban, ágra akasszuk.

A csapdázás megkezdésének szokásos időpontja május közepe.

A CSALOMON® csapda szelektivitása: helytől függően 5-10%-ban foghat egyes *Cnephasia* molyfajokat, melyek kisebbek; ill. *Pyrausta verticalis*-t, utóbbinak nagyobb, világos sárgás alapszínű szárnya van; a fenyőiloncát mindegyiktől jól megkülönböztethetővé teszi szárnyainak jellegzetes téglavörös mintázata.

www.pflanzengallen.de



cfs.nrcan.gc.ca



A lárva és kártétele, amit meg kell előznünk

A CSALOMON® csapda vonzóképesége: környezeti viszonyoktól függően 4-6 hét. Ezután a csapdát a biztonságos rajzáskövetés érdekében cserélje újra! Ragacslapcsere: a fogástól függően, szükség szerint (általában 7-10 naponként). Feromoncsapdáinkkal kiválóan követhetjük a lepkék megjelenését és rajzásmenetét. A kártevő számára kedvező év esetén több rajzáscsúcs is kialakulhat.


A védekezésre ajánlott szerek alkalmazhatók [1]. (A rovarölőszerek használatánál szigorúan tartsa be a vonatkozó munka- és egészségvédelmi előírásokat!) Vegye tekintetbe az alternatív védekezési módszereket is! [2]

[1] *Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok. Évente megjelenő kiadvány, beszerezhető: megyei Növényvédő (NTSZ) Állomások; www.ontsz.hu/engedelyezes/nyitolap.html; WIN-PESZTI (www.relemi.hu)* [2] *Biogazda 2., Biokultúra Egyesület 1994.*



oregonstate.edu

A lárva és kártétele, amit meg kell előznünk



A **Csalomon N** az MTA ATK Növényvédelmi Intézet bejegyzett védjegye.

Megrendelés / felvilágosítás: MTA ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest, Pf. 102., 1525; tel.: (1)-391-8637, 06-30-9824999; fax: (1)-3918655; e-mail: <csalomon@julia-nki.hu> vagy <h2371tot@ella.hu>; internet: <www.julia-nki.hu/csalomon>



Így néz ki, ha a CSALOMON® RAG csapda megfogta!