

Napraforgómoly - *Homoeosoma nebulellum* Den. & Schiff.

A lepke testhossza 10-12 mm, szárny-fesztávolsága 22-26 mm. Elülső szárnyainak alapszíne szürkésfehér, némi barnás behintéssel. A felső szegély fehér, 4-4 jól kivehető fekete pontot visel. Hátsó szárnya áttetsző fehéres.

A hernyó tápnövénye: napraforgó, őszirózsa, egyéb vadon élő fészkesvirágzatú, pl. bogáncs, aszat, bojtorján.

Kárképe: a virágzat szövedékkal borított, benne rágcsálék és ürülék van. A hernyók a virágokat, majd a vackot, magvakat károsítják.

A feromoncsapdát a napraforgófejek magasságába - lehetőleg minél közelebb a fejhez - akasszuk. A csapdázás megkezdésének szokásos időpontja május eleje.



A lepke, amit a csapda fog

A CSALOMON® csapda szelektivitása: más faj csak véletlenszerűen kerül a csapdába.

A CSALOMON® csapda vonzóképesége: környezeti viszonyoktól függően 4-6 hét. Ezután a csapdát a biztonságos rajzáskövetés érdekében cserélje újra!

Ragacslapcsere: a fogástól függően, szükség szerint (általában 7-10 naponként).




lamar.colostate.edu

A lárva és kártétele, amit meg kell előznünk

Feromoncsapdáinkkal időben észlelhetjük a napraforgómoly megjelenését és kiválóan követhetjük **rajzásmenetét**. A kártevő számára kedvező években több rajzáscsúcs is kialakulhat.


A csapdafogások alapján időzített vegyszeres védekezésre ajánlott szerek alkalmazhatók, amelyekhez eseti engedély szükséges lehet [1]. Alternatív védekezési mód olyan ellenálló hibridek termesztése, amelyeknél hamarabb kialakul a kemény maghéj. (A rovarölőszerek használatánál szigorúan tartsa be a vonatkozó munka- és egészségvédelmi előírásokat!) Vegye tekintetbe az alternatív védekezési módszereket is! [2]

[1] Növényvédő szerek, termésmnövelő anyagok. Évente megjelenő kiadvány, beszerezhető: megyei Növényvédő (NTSZ) Állomások; www.ontsz.hu/engedelyezes/nyitolap.html; WIN-PESZTI (www.relemi.hu) [2] Biogazda 2., Biokultúra Egyesület, 1994.



A **Csalomon N** az MTA ATK Növényvédelmi Intézet bejegyzett védjegye.

Megrendelés / felvilágosítás: MTA ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest, Pf. 102., 1525; tel.: (1)-391-8637, 06-30-9824999; fax: (1)-3918655; e-mail: csalomon@julia-nki.hu vagy h2371tot@ella.hu; internet: www.julia-nki.hu/csalomon



Fotó: Nagy Z. L.

Így néz ki, ha a CSALOMON® RAG csapda megfogta!