

Kormos gyantamoly - *Petrova resinella* L.

www.schmetterlinge.at

A lepke testhossza kb. 8 mm, szárny-fesztávolsága 16-20 mm. Elülső szárnyainak alapszíne sötét, feketésbarna, ólomszürke hullámvonalakkal. Hátsó szárnya halványbarna, világos rojtokkal.



A lepke, amit a csapda fog

A hernyó tápnövénye: erdeifenyő, egyéb *Pinus* fajok. Kárképe: többéves fejlődésű; a fiatal hernyók a rügykoszorú alatt rágnak, ennek következtében gyantafolyás indul meg. Gyantából, rágcsálékból, ürülékből készült gyantagubacsban telel át. A következő évben tovább károsít, végül a gubacs mogyoró nagyságúra nő. A hernyó általában másodszor is áttelel a gubacsban és a harmadik évben bábozódik. Különösen a 6 - 10 éves ültetvényben szaporodik el. Gyakran a fenyőiloncával (*Evetria buoliana*) közösen lép fel; e fajra is kapható feromonos csapda!

A feromoncsapdát 2 - 2,5 m magasságban, ágra akasszuk. A csapdázás megkezdésének szokásos időpontja április vége.

A CSALOMON® csapda szelektivitása: helyenként jelentős %-ban foghat kéregmolyt (*Enarmonia formosana*), melynek szárnyformája és mintázata (elülső szárnya sötétbarna alapon sárga/narancssárga harántcsíkokkal díszített) könnyen elkülöníthető a kormos gyantamolytól.




A CSALOMON® csapda vonzóképesége: környezettől függően 4-6 hét, általában elegendő a kártevő éves rajzásának jelzésére. Ragacsapcsere: fogástól függ, (ált. 7-10 naponként).

A lárva és kártétele, amit meg kell előznünk

Feromoncsapdáinkkal kiválóan követhetjük a lepkék megjelenését és rajzásmenetét. Tömeges rajzás észlelése esetén időben felkészülhetünk a bekövetkező lárvakár elhárítására. A rovarölőszerek használatánál szigorúan tartsa be a vonatkozó munka- és egészségvédelmi előírásokat! [1] Vegye tekintetbe az alternatív védekezési módszereket is! [2]

[1] Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok. Évente megjelenő kiadvány, beszerezhető: megyei Növényvédő (NTSZ) Állomások; www.ontsz.hu/engedelyezes/nyitolap.html; WIN-PESZTI (www.relemi.hu) [2] Biogazda 2., Biokultúra Egyesület, 1994.



A **Csalomon N** az MTA ATK Növényvédelmi Intézet bejegyzett védjegye.

Megrendelés / felvilágosítás: MTA ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest, Pf. 102., 1525; tel.: (1)-391-8637, 06-30-9824999; fax: (1)-3918655; e-mail: <csalomon@julia-nki.hu> vagy <h2371tot@ella.hu>; internet: <www.julia-nki.hu/csalomon>

kormos gyantamoly
P. rasinella



Így néz ki, ha a CSALOMON[®] RAG csapda megfogta