Hogyan használjuk? A CSALOMON® PALz csapda, cseresznyelégy csalétekkel

Mind a hat faj ugyanazzal a csapdával és csalétekkel fogható!

Az optimális színinger a zöldessárga!

A csalétek: táplálkozási csalétek (NEM feromon), emiatt a hímek mellett NŐSTÉNYEKET is fog.

Alkalmazható: új területekre való betelepülés észlelésére, a szezonális megjelenés (rajzáskezdet) észlelésére, a rajzás követésére, a védekezés (ha szükséges) időzítésére

európai cseresznyelégy
(*Rhagoletis cerasi*)

amerikai keleti cseresznyelégy
(*Rhagoletis cingulata*)

dió buroklégy
(*Rhagoletis completa*)

homoktövislégy
(*Rhagoletis batava*)

rózsa-gyümölcslégy
(*Carpomyia schineri*)

napraforgólégy
(*Strauzia longipennis*)

Miért fontos a csalétek?













A cseresznyelegyeket és más fúrólégyfajokat világszerte sárgalapokkal csapdázzák. A CSALOMON® PALz csapdával szállított táplálkozási csalétkünk hozzáadása azonban jelentősen megnöveli a fogást, így a csapda érzékenységét, felhasználhatóságát is!

(Az adartok forrása: előadás a 60. Növényvédelmi Tudományos Napokon, Bp., 2014; Agrofórum Extra 63:81-83, 2016.

Európai cseresznyelégy (*Rhagoletis cerasi*) és amerikai keleti cseresznyelégy (*R. cingulata*)



A kifejlett légy (*R. cerasi*)



Cseresznyelégy nyűvek a gyümölcsben (Foto: Voigt E.)



A kifejlett légy (*R. cingulata*)



A *R. cerasi* hazánkban és Eurázsia nagy részén őshonos.
A *R. cingulata* jelenlétét 2006-ban észlelték nálunk, jelenleg mindenütt előfordul.
(MezőHír (4): 24-26, 2009)



R. cerasi

A szárnymintázatok különbsége
(www.agronaplo.hu nyomán)

R. cingulata

R. cerasi

R. cingulata

A két cseresznyelégy faj rajzásmenete

a korona felső részébe kihelyezett csalétkes PALz csapdákban

(meggy ültetvény, Agárd, 2007; az adatok forrása: Agrofórum 19:70-71, 2008)



Látható, hogy a *R. cingulata* jelentősen később rajzik, mint a *R. cerasi*, tehát inkább a későn érő fajtákat veszélyeztetheti.

Európai cseresznyelégy (*R. cerasi*) rajzásmenete

a koronába különböző magasságban kihelyezett csalétkes PALz csapdákban

(házikert, Budapest, 2004; az adatok forrása: Növényvédelem 40:229-236, 2004)



Nagyon fontos, hogy cseresznyelégy csapdánkat a korona felső részébe, napsütötte helyre tegyük ki, mert a legyek előszeretettel itt rajzanak. A lentebbi, “kényelmesen elérhető” magasságban kirakott csapdák a legyek megjelenését, a rajzás kezdetét csak megkésve észlelik, és nem tudják a rajzás menetét sem biztonsággal követni!

A cseresznyelégy csapdánkat a kellő magasságba helyezhetjük egy karó végére szerelve.



A csapda magasra való kihelyezését segíti a tartozékként rendelhető akasztó drót is, mellyel és egy rúd (pl. horgászbot, stb.) segítségével a kívánt magasságban levő ágra akaszthatjuk csapdánkat.

Dió buroklégy (nyugati dióburok fúrólégy; *Rhagoletis completa*)



A kifejlett légy (*R. completa*)

Dió buroklégy nyűvek kártétele (Foto: Voigt E.)

Párosodó dió buroklegyek (Foto: Jósvai J.)

R. completa legyek a csapdában (Foto: Tóth M.)



A *R. completa* Északamerikában őshonos faj, jelenlétét Magyarországon a 2010-es évek közepén mutatták ki (Agrofórum Extra 53:48-52, 2014). Jelenleg már (2026) az ország egész területén előfordul, és komoly károkat okoz. Földrajzi továbbterjedésének jelzésére (karantén!), rajzáskezdetének észlelésére és a rajzásmenet követésére érzékeny, olcsó és könnyen használható eszköz a CSALOMON® PALz csapda csalétekkel!

A dió buroklégy rajzása csalétkes PALz csapdákban:

(dió ültetvény, Prelog, Horvátország, 2014)



A csapdák elhelyezési magassága:

A koronában magasabbra kirakott csapdák korábban jelzik a megjelenést és megbízhatóbban követik a rajzás menetét! (Az adartok forrása: előadás a 60. Növényvédelmi Tudományos Napokon, Bp., 2014)



A csapda magasra való kihelyezését segíti a külön tartozékként rendelhető akasztó drót is, mellyel egy rúd segítségével a kívánt magasságban levő ágra akaszthatjuk csapdánkat.

Homoktövislégy (*Rhagoletis batava*)



A kifejlett légy (*R. batava)*

Homoktövislégy nyűvek kártétele (Foto: L.D. Shamanskaya)

A *R. batava* eredetileg Szibériában fordult elő, jelenlétét és kártételét azonban váratlanul több északeurópai országban (Németo., Finno., Fehéroroszo., Lengyelo., Litvánia) észlelték a 2010-es években. Magyarországon eddig egyelőre még nem mutatták ki (2026), de betelepedése várható. Megjelenésének érzékeny jelzésére olcsó és könnyen használható eszköz a CSALOMON® PALz csapda csalétekkel!



Homoktövislégy rajzásmenete csalétkes CSALOMON® PALz csapdákban (homoktövis ültetvény, Frankfurt/Oder, Németország, 2015)



Az adatok forrása: Agrofórum Extra 63:81-83, 2016)

• = leolvasási dátumok

Napraforgólégy (*Strauzia longipennis*)

A kifejlett légy (*S. longipennis)*





Napraforgólégy nyűvek kártétele, és petét rakó légy (Foto: P. Baufeld)



Napraforgólégy rajzásmenete (2012, Németország) (napraforgó tábla, Berlin Dahlem, 2012; az adatok forrása: Tóth M., Baufeld P. Agrofórum, 29:54-58, 2018)

A *S. longipennis eredetileg* Amerikában honos kártevő. A szakembereket meglepetésként érte, amikor a 2010-es évek elején Németországban váratlanul megjelent néhány táblában, károkat is okozva. Magyarországon egyelőre még nem mutatták ki (2026), de betelepedése elképzelhető. Megjelenésének jelzésére érzékeny, olcsó és könnyen használható eszköz a CSALOMON® PALz csapda csalétekkel!

Rózsa-gyümölcslégy (*Carpomyia schineri*)

A kifejlett légy (*C. schineri)*
www.inaturalist.nz/taxa



A rózsa-gyümölcslégy nyűvek kártétele (Foto: Voigt E.)

A rózsa-gyümölcslégy hazánkban mindenfelé elterjedt, első említése még 1947-ből való (Kertészeti Főiskola arborétuma).



Rózsa-gyümölcslégy rajzásmenete csalétkes PALz csapdákban (vadrózsa sövény, Érd-Elviramajor, 2015; az adatok forrása: Acta Agraria Debreceniensis 66:96-99, 2015)

Kártételt rózsafajok termésén, a csipkebogyón okoz, ami fontos C-vitamin forrás, a szárított gyümölcs tea alapanyag, lekvárja a „hecsedli”, és a szárított bogyó ismert virágkötészeti anyag. Rajzáskezdetének észlelésére, rajzáskövetésre használhatja a csalétekkel ellátott CSALOMON® PALz csapdát!

Rózsa-gyümölcslegyek a CSALOMON® PALz csapda ragacslapján (Foto: Tóth. M.)

Esetenként a csapdába beragadó, a gyakorlatlan szem által a célkártevő fajokkal összetéveszthető, a fogást szennyező légyfajok

Zellerlegyek a PALz csapdába ragadva (Foto: Tóth M.)



A zellerlégy (*Euleia heraclei*) gyümölcsfákon nem károsít, a lárvája zelleren él. Elképzelhető, hogy a csalétkes PALz csapda zellertermesztők számára is hasznos lesz előrejelzésre, de ezzel kapcsolatban további vizsgálatok szükségesek, saját tapasztalatunk nincs.

Az Európában előforduló, nem kártevő *Chaetostomella cylindrical* legyeket könnyű összetéveszteni a napraforgóléggyel (*S. longipennis*)

Megrendelés: CSALOMON Kft., 1116 Budapest, Kondorfa u. 1. tel +06-30-982-4999,
e-mail: ugyfelszolgalat@csalomon.hu
honlap: www.csalomoncsapdak.hu

Köszönetnyilvánítás: az ismertető készítésében közreműködött Tóth M. és Voigt E.

©2026



Párosodó *C. cylindrical* legyek