

Hogyan használjuk? A CSALOMON® VARb3k csapda, aranyos és rezes virágbogarak (*Cetonia a. aurata*, *Potosia cuprea*) csalétkével



Csalétek


VARb3k
csapda

<https://richardsinverts-store.com>



aranyos virágbogár (*Cetonia a. aurata*)

<http://beetlespace.wz.cz>




rezes virágbogár (*Potosia cuprea*)

Ez a két faj ugyanazzal az egyfajta csalétekkel és VARb3k csapdával fogható!
A csalétek táplálkozási csalétek (NEM feromon), emiatt a hímek mellett NŐSTÉNYEKET is csalogat.

Az optimális színinger az élénk kék, ez felerősíti a csalétek vonzó hatását, fogásnövelést eredményez!



A csapda alkalmazható: új területekre való betelepülés észlelésére, a szezonális megjelenés (rajzáskezdet) észlelésére, a rajzás követésére, a védekezés (ha szükséges) időzítésére, valamint a kár csökkentésére a kártevő gyérítésével.

<https://richardsinverts-store.com>



aranyos virágbogár (*Cetonia a. aurata*)

Az aranyos virágbogár (rózsabogár) (*Cetonia a. aurata*) és a rezes virágbogár (olajzöld virágbogár) (*Potosia cuprea*)



rezes virágbogár (*Potosia cuprea*)

<http://beetlespace.wz.cz>

© František Bučinský



Mindkét virágbogár fal polifág, azaz sokgazdás kártevő, fásszárúak (köztük gyümölcsfajok), cserjék, pl. a termesztett és vad rózsafajok és dísznövények virágát károsítja, de gyakran jelentős gyümölcskárokat is okoz: pl. őszibarackon és kajszin, fügén, de néha szőlőn és még számos más gyümölcsön is! Rágásukkal az éređő gyümölcsöket teszik fogyaszthatatlanná.





A kék színinger jelentősége

Mivel mind az aranyos, mind a rezes virágbogár nappali életmódú, élénk színekre is érzékenyek. Mindkét faj esetében a kék szín növelte meg legjobban a csalétek fogását, ezért kék színű a VARb3k csapda fogótölcsére!




Virágbogarak fogásai különböző színű csapdákból. Erdei írtásterület, bokrokkal (*Rosa*, *Crataegus*, stb.) Telki, 2003. Az adatok

forrása: Előadás, XV. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum, 2005.


Az aranyos és a rezes virágbogár földrajzi előfordulása:



Aranyos virágbogár
(*C. a. aurata*)



Az aranyos és a rezes virágbogár hazánkban mindenütt gyakoriak, mind a sík, mind a dombos, területeken, de a hegyekben is. Európában a kifejezetten északi országok kivételével mindenütt jelen vannak, és megtalálhatók Ázsiában, főleg a Közel-Kelet országában is.



Rezes virágbogár (*P. cuprea*)



Nálunk különösen érzékeny gyümölcskárokat okoznak az éredő őszibarackon, kajszin, nektarin gyümölcsön. Másutt Európában, elsősorban a tőlünk délre eső országokban is, kártevőként vannak számon tartva (pl. zadari jelenlét Horvátországban, őszibarack ültetvényben

Glasnik zastite bilja
3/2009:19-26.).

Szezonális megjelenésük, rajzásuk:

Mindkét virágbogár faj nálunk nyáron, június-július folyamán rajzik, és okoz kárt.

Fotó: Nikl F..



Kártétel egy gradációs évben (nektarin).

Aranyos és rezes virágbogarak rajzása (házikert, Debrecen (az adatok forrása: Szarukán I. és Tóth M. nem publ.)

A virágbogarak gyérítése, az okozott kár mérséklése



Fotó: J. Razov

Virágbogarak fogására kirakott VARb3k csapda egy Zadar (Horváto.) melletti barackosban.

Megfogott virágbogarak a VARb3k csapdában – ezek már egy barackot sem károsítanak!



Fotó: Tóth M.

Eltérően a molylepke fajok (almamoly, szilvamoly, stb.) közismert szexferomonos csapdáitól, melyek csak előrejelzésre alkalmasak, ez a két virágbogár kártevő **gyéríthető is** a csalétkes VARb3k csapda használatával, mivel a kárt ténylegesen okozó életfázist, a kifejlett bogarakat fogjuk be, és így az okozott kár is **mérsékelhető**.

Fotó: Nikl F..



A virágbogarak nagy valószínűséggel zömmel a gyümölcsösökön **kívülről** repülnek be és okoznak kárt az érédo gyümölcsökön lyukakat rágva, tömeges rajzás esetén az egész gyümölcsöt elfogyasztva.

Egy különböző érésidejű fajtákkal telepített őszibarack ültetvényben azokra a sorokra, ahol a fajta érédfélben volt, kb. 10x15m-es kötésben csalétkes VARb3k csapdákat raktunk ki. A fajta szürete után a csapdákat a következő érésű fajta soraira vándoroltattuk át. A csapdás részen levő fákon **nem volt károsítás**, míg a gyümölcsös nem védett részén mintegy **20%-os gyümölcskárt** észleltünk.

(Hajdúhadház, 2004. Az adatok forrása: [Agrofórum 16:63-64, 2005](#))

Megrendelés: CSALOMON Kft., 1116 Budapest, Kondorfa u. 1. tel +06-30-982-4999, e-mail: ugyfelszolgalat@csalomon.hu honlap: www.csalomoncsapdak.hu

Köszönetnyilvánítás: az ismertető készítésében közreműködött Tóth M. és Voigt E.